УДК: 517.542

Компьютерное исследование голоморфной динамики экспоненциального и линейно-экспоненциального отображений

И. В. Матюшкин^{1,a}, М. А. Заплетина^{2,b}

¹НИИ Молекулярной электроники,
124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-ый Западный проезд, 12, строение 1

²Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН,
124365, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Советская, д. 3

E-mail: ^aimatyushkin@niime.ru, ^bzapletina_mariya@mail.ru

Получено 12.03.2018, после доработки — 10.05.2018.

Принято к публикации 10.05.2018.

Работа принадлежит направлению экспериментальной математики, исследующей свойства математических объектов вычислительными средствами компьютера. Базовым отображением служит экспоненциальное, топологические свойства (букеты Кантора) которого отличаются от свойств полиномиальных и рациональных функций на комплексной плоскости. Предметом исследования являются характер и особенности множеств Фату и Жюлиа, а также точек равновесия и орбит нуля трех итерированных комплекснозначных отображений: $f: z \rightarrow (1 + \mu)\exp(iz)$, $g: z \rightarrow (1 + \mu|z - z^*|)\exp(iz)$,

$h: z \rightarrow (1 + \mu(z - z^*))\exp(iz)$, где $z, \mu \in \mathbb{C}$, $z^*: \exp(iz^*) = z^*$. Для квазилинейного отображения g , не обладающего свойством аналитичности, было обнаружено два бифуркационных перехода: рождение новой точки равновесия (для него было найдено критическое значение параметра, а сама бифуркация представляет собой смешанный случай «вилки» и седлоузельного перехода) и переход к радикальной трансформации множества Фату. Выявлен нетривиальный характер сходимости к фиксированной точке, связанный с появлением «долин» на графике скоростей сходимости. Для двух других отображений существенна монопериодичность режимов, отмечен феномен «удвоения периода» (в одном случае по пути $39 \rightarrow 3$, в другом — по пути $17 \rightarrow 2$), причем обнаружено совпадение кратности периода и числа рукавов спирали множества Жюлиа в окрестности фиксированной точки. Приведен богатый иллюстративный материал, численные результаты экспериментов и сводные таблицы, отражающие параметрическую зависимость отображений. Сформулированы вопросы для дальнейшего исследования средствами традиционной математики.

Ключевые слова: голоморфная динамика, экспериментальная математика, итерированные отображения, нелинейная динамика, бифуркация, фракталы, множество Жюлиа, множество Фату, комплексная экспонента

UDC: 517.542

Computer research of the holomorphic dynamics of exponential and linear-exponential maps

I. V. Matyushkin^{1,a}, M. A. Zapletina^{2,b}

¹JSC Molecular Electronics Research Institute,
12/1 1st Zapadnyi Proezd, Zelenograd, Moscow, 124460, Russia

²Institute for Design Problems in Microelectronics of Russian Academy of Sciences,
3 Sovetskaya st., Zelenograd, Moscow, 124365, Russia

E-mail: ^aimatyushkin@niime.ru, ^bzapletina_mariya@mail.ru

Received 12.03.2018, after completion — 10.05.2018.

Accepted for publication 10.05.2018.

The work belongs to the direction of experimental mathematics, which investigates the properties of mathematical objects by the computing facilities of a computer. The base is an exponential map, its topological properties (Cantor's bouquets) differ from properties of polynomial and rational complex-valued functions. The subject of the study are the character and features of the Fatou and Julia sets, as well as the equilibrium points and orbits of the zero of three iterated complex-valued mappings: $f : z \rightarrow (1 + \mu)\exp(iz)$, $g : z \rightarrow (1 + \mu|z - z^*|)\exp(iz)$, $h : z \rightarrow (1 + \mu(z - z^*))\exp(iz)$ with $z, \mu \in \mathbb{C}$, $z^* : \exp(iz^*) = z^*$. For a quasilinear map g having no analyticity characteristic, two bifurcation transitions were discovered: the creation of a new equilibrium point (for which the critical value of the linear parameter was found and the bifurcation consists of “fork” type and “saddle”-node transition) and the transition to the radical transformation of the Fatou set. A nontrivial character of convergence to a fixed point is revealed, which is associated with the appearance of “valleys” on the graph of convergence rates. For two other maps, the monoperiodicity of regimes is significant, the phenomenon of “period doubling” is noted (in one case along the path $39 \rightarrow 3$, in the other along the path $17 \rightarrow 2$), and the coincidence of the period multiplicity and the number of sleeves of the Julia spiral in a neighborhood of a fixed point is found. A rich illustrative material, numerical results of experiments and summary tables reflecting the parametric dependence of maps are given. Some questions are formulated in the paper for further research using traditional mathematics methods.

Keywords: experimental mathematics, bifurcation, fractal, holomorphic dynamics, complex maps, nonlinear dynamics, Julia set, Fatou set, complex-valued exponent

Citation: *Computer Research and Modeling*, 2018, vol. 10, no. 4, pp. 383–405 (Russian).

1. Введение

Фракталы, часто определяемые как самоподобные множества, до сих пор являются популярным объектом исследования. Их исследование аналитическими методами, как правило, затруднено, поэтому на первый план выходят компьютерные методы. Для построения фракталов обычно применяют некоторую динамическую процедуру, например, в виде алгоритма «черепаший» графики.

В нашем случае инструментальным средством выступает итерированное комплекснозначное отображение. Его можно рассматривать как дискретизованную по времени форму динамики механической системы с двумя степенями свободы:

$$\begin{cases} dx/dt = F_1(x, y) \\ dy/dt = F_2(x, y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = x + iy, \\ dt = 1 \end{cases} \Rightarrow z^{t+1} = F(z^t), \quad z \in \mathbb{C}.$$

Однако и, наоборот, само отображение может исследоваться через ассоциированные с ним фрактальные образы; как мы увидим, характер устойчивости положений равновесия (чаще применяется синоним «фиксированная точка», equilibrium = fixed point = fixpoint) находит отражение в топологии множеств Жюлиа и Фату. Данная работа принадлежит направлению экспериментальной математики [Uludag, Aygal, 2017], исследующей средствами компьютера свойства математических объектов, чтобы помочь в постановке задач для математиков-классиков. Феноменологическое описание служит цели привлечь внимание к незамеченным ранее особенностям экспоненциальных отображений и, по-видимому, впервые изучаемым линейно-экспоненциальным отображениям.

В конце 70-х гг. прошлого века стала ясной связь динамики комплекснозначных отображений и сложных топологических объектов, прежде всего фракталов [Пайтген, Рихтер, 1993; Schleicher, 2008]. Для итерированного квадратичного отображения $z \rightarrow z^2 + \lambda$, $z, \lambda \in \mathbb{C}$ были визуализированы множества Мандельброта [Mandelbrot, 1977] в виде т.н. «пряничного человека», или «черного карлика» и Фату с характерными элементами вида дракона Хартера-Хейтуэя. Конструкции множеств Фату — также дополнительного к нему на римановой сфере множества Жюлиа — и Мандельброта легко обобщить на любое комплекснозначное отображение. К началу 2000-х гг. уже [Devaney, 1991, 1999] исследовались отображения: поворота на рациональный угол, полиномиальные, дробно-линейные, рациональные (например, одно из популярных $z \rightarrow z^2 + z^{-2}$) и, наконец, экспоненциальные [Ghys et al., 1985] вида $\{ae^z + be^{-z}\}$, $(a, b) \in \mathbb{C}^2$. К последним относится [Кароог, Prasad, 1998, 1999; Prasad, 2005] и первый объект нашего исследования — однопараметрическое семейство отображений $z^{t+1} = f(z^t)$, $f(z) = (1 + \mu)\exp(iz)$, $\mu \in \mathbb{C}$. Наличие мнимой единицы i в показателе несущественно и удобно лишь для визуализации. Следует сказать, что первые работы по итерированной динамике комплексной экспоненты относятся к концу 1980-х гг. [Ghys et al., 1985; Baker, Rippon, 1989; Geluk, 1996; Petek, Kirchgraber, 1998; Romera et al., 2000].

Кроме того, из более общей задачи исследования равновесий ансамбля однородных экспоненциальных отображений с локальной линейной связью следует актуальность исследования линейно-экспоненциального отображения в двух вариантах — квазилинейном и линейном:

$$\begin{aligned} g(z) &= \lambda(z)\exp(iz), \lambda = 1 + \mu|z - z^*| \\ h(z) &= \lambda(z)\exp(iz), \lambda = 1 + \mu(z - z^*) \end{aligned}, \quad \mu \in \mathbb{C}, \quad z^* : z^* = \exp(iz^*). \quad (1)$$

Ансамбль таких отображений представляет собой клеточный автомат (КА) с непрерывными комплексными значениями — или, как указывается в [Garcia-Morales, 2016], получается в результате предельного перехода последовательности классических КА. Параметр μ характеризует силу связи соседних «осцилляторов», ячеек автомата.

Как известно, топология множеств Мандельброта и Жюлиа экспоненциальных отображений типа $ae^z + be^{-z}$, $a, b, z \in \mathbb{C}$ [Devaney, 1999; Urbanski, Zdunik, 2004] существенно отличается от классического случая квадратичных $z^2 + c$, $c \in \mathbb{Z}$, демонстрируя элементы букета Кантора [Devaney, 1999; Aarts, Oversteegen, 1993; Kotus, 2009; Rocha, 2002a, 2002b], аналога канторовой пыли для двух измерений. Для экспоненциальных отображений [Mihaljević-Brandt, 2009; Rempe-Gillen, Sixsmith, 2016] $f_\lambda = \lambda e^z$ был получен ряд теоретических результатов, один из которых [Ghys et al., 1985; Goldberg, Keen, 1986] выделяет особую точку $(0,0)$: 1) если существует аттрактор, то орбита точки 0 стремится к нему; 2) если орбита нуля уходит в бесконечность, то множеством Жюлиа является вся комплексная плоскость.

Ранее мы исследовали базовое отображение $z \mapsto \exp(iz)$ [Matyushkin, 2016], заменой легко сводимое к стандартному виду, и:

- нашли единственное устойчивое равновесие $z^* \approx 0.576 + 0.375i$, $|z^*| \approx 0.687$ и неустойчивые кратные циклы;
- убедились, что точка 0 действительно является скрытым равновесием (окрестность нуля переходит в малую окрестность z^* примерно за 15–20 итераций);
- построили множества Жюлиа и Фату, в структуре последнего обратили внимание на области локального повышения скорости сходимости;
- построили множество Мандельброта для семейства λe^{iz} , $\lambda \in \mathbb{C}$ (стартовая точка — нуль).

Как и раньше, предметом исследования будут множества Фату и Жюлиа, а также равновесия и орбита нуля. Раскраска этих множеств в ряде случаев выявляет нетривиальный характер их внутренней структуры.

Дадим некоторые определения. Орбитой $orb_f(z^0)$ точки $z^0 \in \mathbb{C}$ называется последовательность $\langle z^0, z^1, \dots, z^n, \dots \rangle$, $z^{n+1} \equiv f(z^n) \equiv f^{(n+1)}(z^0)$, $n \in \mathbb{N}$. Строгое определение множества Жюлиа $J(f)$ итерированного комплексного отображения $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ (иногда вводят расширенную плоскость $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, изоморфную сфере Римана) можно найти, например, в монографии [Милнор, 2000]. Дополнительное к нему множество Фату $F(f)$ всегда является открытым и состоит из точек z , таких, что в достаточно малой окрестности $U(z)$ последовательность итераций $f^{(n)}$ образует нормальное семейство в (метрическом) смысле Монтеля. Важным приближением к множеству Жюлиа является множество точек убегания (escaping set) $J_{esc}(f) \subseteq J(f)$, т. е. $J_{esc} = \{z: f^{(n)}(z) \rightarrow \infty\}$. В менее строгой, но более понятной формулировке: точка принадлежит множеству Жюлиа тогда и только тогда, когда среди орбит точек ее окрестности найдутся две существенно различные (т. е. метрически близкие точки дают качественно или количественно разную динамику). Поэтому иногда говорят о границе множества Жюлиа ∂J , в окрестности точек которой есть как убегающие точки, так и точки множества Фату с ограниченным носителем орбиты; тогда к множеству Жюлиа $J(f)$ добавляется эпитет «заполненное» (filled).

2. Методика эксперимента

В эксперименте орбитой точки z для отображения f будем считать конечный кортеж $\langle z^0 \equiv z, z^1 = f(z), \dots, z^T = f(z^{T-1}) \rangle$. Множество Жюлиа считалось нами заполненным и эквивалентным множеству точек убегания, т. е. $J \approx J_{esc} = \{z: (z^0 = z) \Rightarrow (\exists t \leq T)(z^t = \text{Inf})\}$. Использо-

вался стандартный прием визуализации: цвет точки ставился в соответствие скорости сходимости. Множество Жюлиа отображается в серой цветовой гамме, малым значениям t отвечают темные тона, а медленному уходу в бесконечность — светлые тона.

Расчеты проводились в среде MATLAB с двойной точностью (double, 64 бита, см. приложение). Специальных мер повышения точности не предпринималось; переход к алгебраическим вычислениям (команда `vpa`) привел бы к существенному замедлению вычислений на два порядка и более. Как только значение $z(t)$ достигало константы $\text{Inf} = 1.79769e + 308$, считалось, что орбита уходит на бесконечность, и расчет переходил к следующей точке. Заметим, что истинность вычислений ставится под сомнение гораздо раньше — при достижении $\approx 10^{15}$, т. к. для корректного расчета выражения $\exp(iz)$ требуется сохранять по крайней мере второй знак после запятой большого числа (ошибка в 0.1 дает ошибку в фазе на 360). С учетом итерированности требования к точности, вероятно, еще жестче. Мы полагаем, однако, что на качественный характер динамики особенности машинного вычисления не влияют.

По умолчанию глубина итераций (время) составляла $T = 1000$, а пространственная сетка при построении множества Жюлиа — $X \times Y = 1000 \times 1000$ на размер исходной области. Стандартное «окно» для нее: $[-5; 5]^2$, т. е. $-5 \leq \text{Re}(z) \leq 5, -5 \leq \text{Im}(z) \leq 5$.

Для множества Фату выделялись два случая F1 и F2: 1) бассейн точечного аттрактора, фокуса или узла; 2) остальные случаи: периодическая, квазипериодическая или хаотическая орбита. Условие останова в первом случае: либо $|z^{t+1} - z^t| < \varepsilon_1 = 10^{-5}$, либо, если сходимость медленная, $|z^{T+1} - z^T| < \varepsilon_2 = 10^{-2}$. Если последнее условие не выполняется, то точка из F2. По умолчанию точки F1 маркируются цветами от синего (быстрая сходимость) до зеленого, а точки F2 — в желто-красной гамме (в этом случае цветовой тон не существен).

Код MATLAB вынесен в Приложение и легко может быть адаптирован для любой функции $z^{t+1} = f(z^t)$ добавлением соответствующей анонимной функции и опции `case` в оператор `switch` в первых строках скрипта. Скрипт работает в трех режимах: 1) построение орбиты одной точки («выход» в переменную `tr`); 2) построение множеств Жюлиа и Фату; 3) построение орбиты нуля и множеств Жюлиа/Фату. Использовался принцип векторизации посредством конструкции `arrayfun`. Основная тяжесть программирования связана с отображением нестандартной цветовой карты `colormap`, состоящей из трех стандартных. Помимо расчета количества цветов скрипт вычисляет агрегированную характеристику для орбит разного типа, сохраняя ее в структуре `dest` и выводя в консоль. При визуализации использовалась команда MATLAB `pcolor` вместо стандартной `contourf`, чтобы подавить нежелательные эффекты интерполяции цвета. Ромбовидные фигуры на рис. 1 относим на дискретность сетки, где цвет приписывается всему патчу, исходя из цвета одной вычисленной точки.

3. Отображение $f: z \rightarrow (1 + \mu)\exp(iz)$

При $\mu = 0$ имеем базовое отображение с простой динамикой: точки либо уходят на бесконечность, либо притягиваются точкой $(0, 0)$, а затем уже — равновесием z^* , либо, минуя 0, непосредственно попадают в окрестность z^* . Для этого случая множества Жюлиа и Фату уже известны (и, очевидно, 2π -периодичны по $\text{Re } z$, рис. 1). Орбита нуля представляет собой вершины концентрических треугольников, слегка поворачивающиеся вокруг центра (т. е. за три итерации поворот почти на 2π). Визуализируемые небольшими областями повышенной сходимости подмножества множества Фату трактуются как мультиплицирование, возможно, с поворотом, одного широкого подмножества возле равновесия.

Рис. 1. Топология букетов Кантора на множестве Жюлиа отображения f , $\mu = 0$ на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 . Показана единственная притягивающая точка z^* . Образ повернут на 90° по сравнению со стандартным случаем $z \rightarrow \exp(z)$, что облегчает визуализацию. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Множество Мандельброта для $f_\lambda = \lambda \exp(iz)$ показывает наличие возле нуля бассейна притяжения, ограниченного кривой, напоминающей повернутую на 90° кардиоиду [Matyushkin, 2016]. За пределами него лежат области периодических циклов и сеть регионов с хаотическим режимом. Границы этого бассейна на прямой $\operatorname{Re} \lambda = 1$ лежат в приближенных пределах $-0.9 \leq \operatorname{Im} \mu \leq 2.5$.

Будем двигаться в направлении $\operatorname{Re} \mu = 0$, $\operatorname{Im} \mu > 0$, $\mu \nearrow$.

Для $\mu = 1.5i$ качественного изменения динамики (по сравнению с базовым) не наблюдается: 1) сдвигаются лишь влево «кусты», сохраняя дистанцию между собой в π ; 2) изменяются координаты равновесия; 3) замедляется сходимость (в худшем случае: с 30 до 80 итераций). При $\mu = 2.0i$ и $\mu = 2.25i$ эти изменения нарастают, при этом орбита нуля приобретает характер двухрукавной спирали, т. е. равновесие есть фокус, а число итераций до сходимости возрастает до 192 и 384 соответственно. Заметим, что при $\mu = \mu^* \approx 2.475i$ мультипликатор $|f'(\mu, z^*(\mu))|$ становится равным 1.

Таблица 1. Кратности цикла после бифуркации

Параметр $\operatorname{Im} \mu > \operatorname{Im} \mu^*$	Кратность цикла n	Бифуркационное значение
2.48	49	$\operatorname{Im} \mu^* = 2.474440$ $z^*(\mu^*) = 0.191436735086597 +$ $0.981615010858628i$
2.49	51	
2.50	17	
2.51	17	

Примечание: значение положения равновесия дано с повышенной точностью для облегчения верификации, так как само равновесие является нейтральным.

Рис. 2. Орбита точки $(0,0)$ при $\mu = 2.5i$, $T = 1000$, квазипериод состоит из 17 точек. Весь диапазон орбиты $t \in [0; T]$ разбит на несколько частей по цветам радуги, а размер окружности маркера уменьшается с ростом номера точки t . На периоде орбиты выделяются два почти линейных участка. Различия $z(971)$ и $z(988)$ говорят о том, что сходимость еще не достигнута; возможно, это случай квазипериодичности. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Для $\mu = 2.5i$ режим сходимости заменяется на кратно-периодический. На рис. 2 рассмотрена орбита нуля $z^0 = (0,0)$, характеризующаяся циклом с периодом 17. Похожа на нее орбита точки $(0,-2)$ или $(2,-2)$ — период тоже 17 (или кратен 17). При этом множество Жюлиа имеет более сложную структуру (рис. 3): последовательности букетов Кантора, тянущихся с каждого «куста», соединяются и переходят в скручивающуюся многорукавную спираль. В ее центре — равновесие $z^{*,2.5} \approx 0.1902 + 0.9862i$ (мультипликатор $|f'(z^{*,2.5})|$ равен 1.0045, т. е. точка почти нейтральная — центр), вокруг которого компонента множества Фату в виде небольшого диска, идентифицированного нами как диск Зигеля. Экспериментально невозможно отличить принадлежность диску Зигеля от чрезвычайно медленного ухода на бесконечность, как в случае орбиты равновесия $z^{*,2.5}$, вернее, точки в его малой окрестности (рис. 3, b). Визуально на внешней окружности диска Зигеля начинаются 17 спиральных рукавов, компонентов множества Жюлиа, причем у ближних к диску точек уход в бесконечность происходит медленнее, чем у удаленных.

При $\mu = 2.7i$ характер множества Жюлиа вновь меняется, спираль становится двухрукавной (рис. 4), и кратность периода точек множества Фату становится равной 2 (такова орбита нуля). В качестве примера приведем орбиту точки $0 + i$: первые 60 итераций имеет место квазипериодический режим кратности 2, но орбита точки постепенно удаляется от квазиравновесия, затем на 62-й итерации $|z^{62}| > 2000$, и на 63-й точка уходит в бесконечность.

(а) на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 , $\operatorname{Re} z \in [-5; 5]$, $\operatorname{Im} z \in [-5; 5]$

(б) на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 , $\operatorname{Re} z \in [0; 0.4]$, $\operatorname{Im} z \in [0.8; 1.2]$

(в)

Рис. 3. Множества Жюлиа и Фату (а, б) для случая $\mu = 2.5i$ на итерации $t = 1000$ в двух «окнах», а также (в) орбита точки $0.1902 + 0.9862i$ в окрестности $z^{*,2.5}$ — в центре 17 спиральных рукавов находится, по-видимому, диск Зигеля диаметра не более 0.05 и неподвижная точка $z^{*,2.5} \approx 0.1902 + 0.9862i$. Фиолетовый цвет соответствует большим временам (до $T = 1000$). Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Рис. 4. Множества Жюлиа и Фату для случая $\mu = 2.7i$ на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 в окне квадратной формы вблизи равновесия. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

При $\mu = 3i$ портрет множеств Жюлиа и Фату упрощается: для большинства точек, включая ноль, наблюдается двухпериодический режим с устойчивыми равновесиями $z_a = -0.262 + 0.073i$ и $z_b = 1.621 + 2.452i$. Формальное равновесие $z^{*,3} \approx (0.1634, 1.0702)$ с мультипликатором 1.08 довольно быстро — за 200 итераций — переходит в периодический режим. При $\mu = 6i$ орбита формального равновесия сходится к циклу примерно за 20 итераций. Интересно, что характер множества Жюлиа около равновесия по сути повторяет характер самого равновесия — фокус или узел.

Утверждение 1. Отображение $z \rightarrow \lambda \exp(iz)$, $\operatorname{Re} \lambda = 1$, если и имеет периодический режим, то для всех таких точек плоскости его краткость n однозначно определяется параметром, т. е. $n = n(\lambda) < \infty$. Параметр n принимает только некоторые значения (2, 17, кратные 17 и др.).

Примечание: ограниченная точность вычислений и возможность существования узкого диапазона значений параметра, где $n(\lambda)$ меняется плавно (с шагом 1) повышают ценность теоретического исследования. По нашему мнению, переход $17 \rightarrow 2$ скорее всего скачкообразен, а вот $\infty \rightarrow 17$, вероятно, непрерывен (см. таблицу 1). Отметим нарушение монотонности, что отличается от традиционного перехода периодического режима в хаос. Происхождение числа 17 отчасти подсказывает рис. 2 — топологически выделяются три аттрактора: две похожие на «ладонь» группы по 8 точек и удаленная точка, т. е. $17 = 1 + 2 \cdot 8$.

4. Отображение $g: z \rightarrow \left(1 + \mu |z - z^*|\right) \exp(iz)$

Знак модуля вместо скобок в выражении $g(z, \mu)$ выводит функцию из класса аналитических, что делает задачу интереснее. В таблице 2 для выбранных значений μ перечислены некоторые, близкие к z^* , равновесия; они все неустойчивы, кроме случая $\mu = 2.5i$, $z^{*,3}$. Обсудим появление такого равновесия подробнее.

Таблица 2. Некоторые равновесия отображения $g(z, \mu)$ при разных μ

μ	0 (база)	0.25	0.25i	-0.9i	2.5i
z^{*1}	-2.76636 -1.08965i	-2.98998 -0.45682i	-3.74118 -0.93942i	-2.07187 +0.21721i	-4.84608 +1.01677i
z^{*2}	-9.18489 -2.24661i	-9.319401 -0.98569i	-10.53346 -1.26968i	-7.97970 -0.02618i	-11.04836 +0.96522i
z^{*3}	5.98583 -1.83427i	6.13132 -0.93833i	5.16985 -1.21627i	7.67724 -0.16871i	0.37322 +0.58097i

Пусть при некотором $\mu = \mu^{double} : \operatorname{Re} \mu = 0$ одновременно существуют два равновесия z^* , $z^* + \varepsilon$ рядом друг с другом, и, условно говоря, корень трансцендентного уравнения $z = g(\mu, z)$ имеет кратность 2: $z^* = g(\mu, z^*)$, $z^* + \varepsilon = g(\mu, z^* + \varepsilon)$, $\varepsilon \rightarrow 0$. Пренебрегая членами второго порядка, получим:

$$z^* + \varepsilon \approx z^* (1 + \mu |\delta z|)(1 + i\varepsilon) \Rightarrow \varepsilon \left(\frac{1}{z^*} - i \right) = \mu |\varepsilon|,$$

$$\mu^{double} = \frac{\varepsilon}{|\varepsilon|} \left(\frac{1}{z^*} - i \right) \xRightarrow[\varepsilon = |\varepsilon| \exp(i\theta)]{\operatorname{Re} \mu = 0} \theta = \frac{\pi}{2} - \operatorname{angle} \left(\frac{1}{z^*} - i \right), \quad (2)$$

$$|\mu^{double}| = 2.1682, \quad \theta = 2.5442 \approx 146^\circ.$$

Нетрудно видеть, что $\operatorname{Im} \mu = \mu^{double}$ мультипликатор $|g'(\mu, z^*)|$ становится равным 1.

По сравнению с базовым отображением при $\mu = i$ множество Фату устроено более сложно: куст множества Жюлиа более асимметричен относительно своей центральной оси, выделяются три линейчатых области, сходящиеся в точке z^* , где скорость сходимости повышена, а также несколько областей в виде венчиков букетов Кантора, где сходимость локально понижена (рис. 5, рис. 6). Этот «трехдолинный» эффект отсутствует для квадратичных отображений и наблюдается нами впервые. При $\mu = 1.5i$ изменения более разительны, при этом, несмотря на наличие двух максимумов сходимости вместо «долины» (в сочетании с еще двумя максимумами правее) внутри множества Фату, тем не менее, равновесие z^* остается единственным, в то время как вторая точка есть равновесие ложное. Три «долины» исчезают, но одна из них превращается в гантелеобразную фигуру. Обращает внимание деформированность и «завихренность» крайних левого и правого букетов куста (рис. 7).

Вблизи бифуркации $\operatorname{Im} \mu = 2.16 < |\mu^{double}|$ помимо существенного замедления сходимости (300–400 итераций) отчетливо наблюдаются два равновесия (рис. 8): истинное z^* и ложное $z^{*,\mu} \approx -0.765 + 1.875i$, $g(\mu, z^{*,\mu}) = z^*$, переходящее в истинное на следующей итерации. Сама бифуркация аналогична седлоузловому переходу, поскольку наблюдается раздвоение и удаление друг от друга равновесий в направлении угла $\approx 135^\circ$, как предполагалось при выводе (2) — однако при обратном движении равновесие не исчезает. Седлоузловой переход наблюдался ранее [Devaney, 1991; Goldberg, Keen, 1986] и в ситуации $z \rightarrow \lambda \exp(z)$, $\lambda = e^{-1}$. Здесь мы имеем дело скорее со случаем, промежуточным между «транскритической» (т. к. точки «обмениваются» устойчивостью) и «вилочной» (т. к. из одного равновесия рождаются два) бифуркациями.

Рис. 5. Окрестность равновесия z^{*1} , $\mu = 0.25$ (таблица 2) на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 . Существуют даже точки, не успевающие сойтись ни к бесконечности, ни к z^* . Это еще раз доказывает фрактальность множеств Жюлиа и Фату. Эффект пикселизации связан с ограниченным числом знаков при вычислениях, а не с визуализацией или величиной шага сетки. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Рис. 6. Множества Жюлиа и Фату для случая $\mu = 1i$ на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 . Видна характерная «долинная» структура в макроскопической области равновесия. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Рис. 7. Фрагмент множества Жюлиа и Фату для случая $\mu = 1.5i$ на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 . Видна деформированность букетов Кантора. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Рис. 8. Множества Жюлиа (монохром) и Фату (цветное) до бифуркации при $\mu = 2.16i$ на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 . Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Рис. 9. Множество Фату после бифуркации $\mu = 2.20i$ на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 вблизи ложного (а) и истинного (б) равновесия. Истинное равновесие имеет новые координаты $\text{Re}(z^*) \approx 0.545$, $\text{Im}(z^*) \approx 0.398$ и находится рядом с z^* . Синим цветом закрашены точки, обладающие наиболее быстрой сходимостью. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Рассмотрим окрестности равновесий сразу после бифуркации $\text{Im } \mu = 2.2 > |\mu^{\text{double}}|$ через множество Фату (рис. 9). Благодаря членам второго порядка, старое равновесие z^* сохраняет устойчивость в очень малой окрестности; для $z^0 = z^* + 10^{-4}(1+i)$ орбита стремится к z^* , но для $z^0 = z^* + 10^{-3}(1+i)$ орбита сходится к новому равновесию, причем непосредственно по прямой линии, соединяющей оба равновесия, т. е. это равновесие есть узел. Изолинии числа итераций выглядят достаточно необычно (рис. 9): для быстрой сходимости она имеет форму неправильного кольца, причем сам аттрактор расположен в его окрестности, а не в его центре.

Для $\text{Im } \mu = 2.5 > |\mu^{\text{double}}|$ переход окрестностей $U(z^*) \rightarrow U(z^{*3})$ требует примерно 200 итераций, орбита нуля уходит в бесконечность. Однако сами множества Фату и Жюлиа существенно различаются (рис. 10) даже по сравнению с предыдущим случаем $\mu = 2.2i$. Область между двумя «кустами» стала преимущественно принадлежать множеству Жюлиа. Множество Фату теряет односвязность и напоминает «головастиков»; некоторые компоненты множества Жюлиа демонстрируют вариации канторовой пыли в виде «луночек». На выделенной области (рис. 10, а) площади этих множеств составляют примерно 80 % (Жюлиа) и 20 % (Фату). Очевидно, что произошла еще одна бифуркация, но конкретное значение $\text{Im } \mu$ мы затрудняемся указать.

В частности, при $\text{Im } \mu = 2.4$ орбита нуля имеет интересный 14-периодический режим, который состоит из 7 колебаний растущей амплитуды, последнее из которых переводит точку $-983.25 + 268.05i$ в окрестность нуля. Точки $0 - 2i$ и $-3 + i$ также имеют 14-периодический режим. Эти же точки при $\text{Im } \mu = 2.6$ давали 11-ти периодический режим, но если предпоследняя точка периода показывала второй порядок величины, то последняя точка была $\sim 10^{49}$ — чтобы начать новый период от $(0,0)$. Такой порядок величины ставит под сомнение компьютерный расчет. При $\text{Im } \mu = 3$ орбита нуля 8-периодична, а в целом во множестве Фату доля периодических режимов доминирует над долей сходимости к равновесию. При этом внутри «головастиков» возвращается долинный режим, хотя долина и одна (не три, как ранее). При $\text{Im } \mu = 4$ орбита нуля 32-периодична, компонента множества Фату со сходимостью к равновесию («головастики») исчезает, а на ее месте возникает хаотическое смешение точек убегания и точек

с периодической орбитой. По краям этой области еще наблюдается чередование полос периодичности и, вероятно, деформированных букетов Кантора для точек убегания, но ближе к центру мы не находим признаков какой-то упорядоченности.

Утверждение 2. Пусть для фиксированного $\mu : \operatorname{Re} \mu = 0$ задано отображение $g(z) = (1 + \mu|z - z^*|)\exp(iz)$. Тогда: 1) если орбита нуля уходит в бесконечность, то n -периодических режимов с $n > 1$ не существует; 2) если орбита какой-либо точки ζ выходит на n -периодический режим, то точка $(0, 0)$ принадлежит этому периоду, т. е. $(\forall \varepsilon < 0)(\exists t \in \mathbb{N})(|\zeta^t| < \varepsilon)$.

Рис. 10. Множества Жюлиа и Фату для $g : z \rightarrow (1 + \mu|z - z^*|)\exp(iz)$ при $\mu = 2.5i$: общий вид (а) и укрупненный (б). Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Как мы видим, результаты Кин–Голдберг [Goldberg, Keen, 1986] в несколько ослабленной форме справедливы и для нашего отображения. Их можно обобщить, вероятно, либо на линейно-экспоненциальные отображения $z \rightarrow (\mu_0 + \mu z) \exp(z)$, либо на квазимногочлены $P(z) \exp(z)$.

5. Отображение $h: z \rightarrow \left(1 + \mu(z - z^*)\right) \exp(iz)$

Это отображение по динамике проще, чем предыдущее, и больше похоже на классическую экспоненту $f(z)$. Но в отличие от экспоненты множества Фату и Жюлиа теряют периодичность по вещественной оси, и соседние «кусты» как бы вытягиваются и начинают нависать над ближним к нулю «кустом». Их структуру в макромасштабе, например, выше линии $\operatorname{Im} z > 10$, мы не исследовали. В таблице 3 суммированы основные черты динамики и множеств Жюлиа/Фату при вариации параметра, преимущественно по мнимой оси, т. е. $\operatorname{Re} \mu = 0$, $\operatorname{Im} \mu > 0$. Для этого отображения в целом имеет значение число 3, а не 2 или 17. Кроме того, при некоторых значениях параметра множество Жюлиа занимало всю плоскость.

Таблица 3. Сводная таблица по отображению $h(z)$

$\operatorname{Im}(\mu)$	Качественное описание
<i>При движении по мнимой оси</i>	
0.1	Сходимость по схеме трилистника (аналог рис. 11, а), равновесие есть фокус.
0.25	То же.
0.5	Трехпериодический цикл (равновесия удалены от нуля), каждое равновесие — фокус (однорукавная спираль), множество Жюлиа: трехрукавная спираль вблизи — два рукава от одного «куста», один — от другого.
0.75	Трехпериодический цикл (одно из равновесий на ~ 0.1 смещено от нуля), сходимость к каждой точке быстрая по типу узла; касание трех рукавов (рис. 11, а).
1	То же.
1.5	Трехпериодический цикл, одно равновесие в окрестности нуля; три «куста» сходятся в одной точке равновесия (рис. 11, б).
2	Трехпериодический цикл, одно на расстоянии не более $2 \cdot 10^{-4}$ от нуля.
3	То же самое, причем две точки равновесия — 0 и «большая» по модулю.
6	Очень быстрый уход в бесконечность, нет визуализации обоих множеств.
9	Множество Жюлиа занимает всю плоскость, быстрый уход в бесконечность через 0.
12	То же.
20	Трехпериодический режим на грани потери точности, т. е. уход в него из бесконечности: $-27394509.8784864 + 9868306.50217099i$; $0.00000000000000 + 0.00000000000000i$; $8.49398041474234 - 11.5282544606287i$.
<i>Вблизи бифуркационного значения</i>	
0.33	Сходимость по схеме трилистника.
0.45	Медленная сходимость (более 3800) итераций, но сходимость достигается (10 000).
0.46	39-кратный цикл — два элемента удалены, остальные сливаются в одну полосу, ноль принадлежит циклу; орбита точки в окрестности равновесия $+0.05(1 + i)$ сначала показывает квазипериодичность с периодом 3, затем на 720-й итерации срывается в бесконечность; если же сдвиг на $0.01(1 + i)$, то на 1156-й итерации 10^{128} и далее в ноль и 39-членный цикл; хаос возле равновесия, образуемый периодическими и убегающими точками.
$\mu^{bf} =$ 0.454553558 270876	Орбита нуля — аттрактор в форме (полу)замкнутой ленты, не встречается больших значений, периода не обнаружено (рис. 12), ноль входит в аттрактор; орбита $z^* + s(1 + i)$ — аттрактор в виде кольца размера $2 \div 3 \cdot s$, период не обнаруживается, $s = 0.001, 0.01, 0.1$; при сдвиге на 0.01 похожая картина, размер кольца $(2 \div 3) \cdot 0.01$; при $s = 1$ кольцо напоминает ленту для орбиты нуля;

$\text{Im}(\mu)$	Качественное описание
	орбита критической точки: аттрактор, нет периода, окрестность нуля входит в аттрактор, часть аттрактора (южная) плотная, часть содержит разрывы (северная). Множество Жюлиа: спирали проходят на расстоянии от равновесия.
0.47	3-цикл, 0 не входит в цикл.
0.465	39-цикл для орбиты нуля, причем равновесия кластеризуются на три самоподобных группы: в каждой группе есть «лидер», стоящий на отдалении от полукруга его 12 собратьев; все равновесия сосредоточены на «окне» $[-1.5..2; -1..4]$ точка (0,0) рядом с циклом на расстоянии 0.01; 3-рукавная спираль на множестве Жюлиа.
0.4675	3-цикл, к каждому равновесию тянутся 13 рукавов, т. е. сходимость по 13-листнику (рис. 13); нетрудно видеть происхождение прежнего 39-кратного цикла, т. к. $39 = 3 \cdot 13$.
0.4545	Орбита нуля — сходимость к нулю по сложной замкнутой фигуре, за 323 422 итерации.
0.4546	Орбита нуля — орбита возвращается в ноль после ухода к большим значениям порядка 10^{12} ; первый раз это происходит на 2149-й итерации, т. е. 2149-й цикл.
При движении по вещественной оси $\text{Im } \mu = 0$.	
$1/ z^* $	Множество Жюлиа — вся плоскость (рис. 15).
1	Форма множества Фату — «коза-на-ножках», нет периодических режимов, медленная сходимость около 500 (Фату) и 100 (Жюлиа) итераций (рис. 14).

Примечание: Мы используем термины «фокус» и «узел» как визуальные характеристики множества Жюлиа из-за близости к их стандартным графическим определениям. Однако траектории сходимости в действительности могут быть противоположными: «фокусу» может соответствовать узел-равновесие, и наоборот.

Рис. 11. Множества Жюлиа и Фату для $\text{Im } \mu = 0.75 \rightarrow 1.5$ на итерации $t = 1000$, размер вычислительной сетки 1000×1000 . Образование формы трилистника вблизи равновесия. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Анализ формальных критических точек $|h'(z)| = 0$ не дает полезной информации; их значения равны:

$$\mu = \frac{-i}{1 + i(z^{cr} - z^*)} \Leftrightarrow z^{cr} = z^* + \left(i - \frac{1}{\mu}\right), \quad z^{cr, bf} \equiv z^{cr}(\mu^{bf}) = z^* + 3.2000i.$$

Рис. 12. Орбита нуля при бифуркационном значении параметра. Обозначения осей, цветов и размеров маркера те же, что на рис. 2. Глубина расчёта $T = 3000$ итераций. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Рис. 13. Вырождение 39-кратного цикла в тройной с 13-ю рукавами возле бифуркации, $\mu = 0.4546i$: орбита точки $(0,0)$ — трехкратный цикл, каждый узел с 13-ю рукавами. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Интерес представляет нахождение такого значения $\text{Im } \mu = \mu^{bf}$, когда мультипликатор обращается в единицу в самой точке равновесия. Нетрудно получить, что:

$$\mu^{bf} = |z^*|^{-1} - 1 = 0.454553558270876.$$

6. Заключение

Основное содержание статьи представлено на рисунках, что составляет особенность экспериментальной математики в приложении к нелинейной динамике. Ее целью было еще раз привлечь внимание к итерированной экспоненте (и ее модификациях) на комплексной плоскости.

Рис. 14. Множества Жюлиа и Фату при вещественном $\mu = 1$, $\operatorname{Re}(z(t)), \operatorname{Im}(z(t)) \in [-10, 10]$. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Рис. 15. Фрагмент множества Жюлиа при вещественном $\mu = 1/|z^*|$, $\operatorname{Re}(z(t)) \in [-3, 0]$, $\operatorname{Im}(z(t)) \in [0, 3]$. Видна его сложная внутренняя структура. Цветная версия рисунка доступна на сайте журнала

Динамика квазилинейного отображения $g: z \rightarrow (1 + \mu|z - z^*|)\exp(iz)$ более интересна, чем простой экспоненты. Мы увидели по крайней мере два бифуркационных перехода. Для первого, рождения нового равновесия, было найдено критическое значение параметра, а для второго, суть которого в радикальной трансформации множества Фату — нет. Первый переход классифицируется нами как специальный случай «вилочной» бифуркации. Отмечается нестандартный «долинный» характер окрестности равновесия: она неизотропна, и есть направления, где скорость сходимости остается прежней.

Другие два близкие отображения демонстрируют разную динамику в периодических режимах, основанную для классической экспоненты на переходах $\infty \rightarrow 17$, $17 \rightarrow 2$, а для линейно-экспоненциального — на переходе $39 \rightarrow 3$. Для последнего отображения орбита точки $(0,0)$ сохраняет свою важность, но уже не абсолютную в определении сходимости. Сам феномен «удвоения периода» известен уже с исследований Фейгенбаума, однако интересна сама последовательность кратностей периода при изменении параметра в узкой полосе. Также обращает на себя внимание совпадение кратности периода и числа рукавов спирали множества Жюлиа в окрестности неподвижной точки z^* , что, по-видимому, является оригинальным результатом.

Фиксированное максимальное число значащих цифр в машинной записи числа, наличие в орбите точки «больших чисел» ограничивает применение экспериментальных методов для данных отображений — например, при решении вопроса о дискретности изменения кратности периода по натуральному ряду.

В заключение мы сформулируем вопросы, нуждающиеся в решении математиками-теоретиками:

1. Внутри множества Фату обнаруживаются локальные области повышенной скорости сходимости в форме небольших пятен (рис. 2), долин (рис. 6) или колец (рис. 9). Этот феномен мы называем эффектом «желтых пятен», и он отсутствует для квадратичных отображений. Можно ли дать ему строгое формальное определение без обращения к количественным величинам?
2. Действительно ли имеется диск Зигеля при некоторых значениях параметра в каждом из трех вариантов отображений (рис. 3, б заставляет нас сомневаться)?
3. Доказать первую часть утверждения 1 о том, что для данных отображений имеет место монотонная периодичность.
4. Доказать вторую часть утверждения 1 о том, что у каждого из данных отображений кратность цикла пробегает особые значения при изменении параметра вблизи бифуркационного. Так, для семейства f это (...), 51, 17, 2. С чем связаны эти числа?
5. Доказать Утверждение 2 для отображений g, h : если орбита нуля содержит цикл, то существует периодическая компонента множества Фату ненулевой меры, а если цикла нет, то такая компонента отсутствует или ее мера равна нулю.
6. Возможен ли квазипериодический режим? Экспериментально сложно дифференцировать его от двух случаев: а) периодический режим наступает спустя большое число итераций; б) длина периода очень велика (таблица 3, для значения 0.4546). В наиболее общем виде квазипериодические колебания представляют собой колебания с двумя и более компонентами, характеризующимися несоизмеримыми частотами.
7. Доказать или опровергнуть для h -семейства, что при значении параметра, строго равного бифуркационному, аттрактор стремится к форме замкнутой кривой без самопересечений и содержит не всюду плотные подмножества (участки, рис. 12). Утвердительный ответ, по-видимому, будет коррелировать с отрицанием п. 6.
8. Доказать для рассмотренных отображений, что длина периода точек множества Фату совпадает с числом рукавов множества Жюлиа в окрестности неподвижной точки z^* .

Список литературы (References)

- Милнор Дж.* Голоморфная динамика. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. — 320 с.
Milnor J. Dynamics in one complex variable. Introductory Lectures — 2nd edition. Weisbaden: Vieweg Verlag, 2000. — vii + 257 pp. (Russian ed.: *Milnor Dzh. Golomorfnaia dinamika.* — Izhevsk: NIC Reguljarnaja i haoticheskaja dinamika, 2000. — 320 p.)
- Пайтген Х.-О., Рихтер П. Х.* Красота фракталов. Образы комплексных динамических систем / Пер. с англ. — М.: Мир, 1993. — 176 с.
Peitgen H.-O., Richter P. H. The beauty of fractals: images of complex dynamical systems. — Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1986. (Russian ed.: *Pajtgen H.-O., Rihter P. H. Krasota fraktalov. Obrazy kompleksnyh dinamicheskikh system* / Per. s angl. — Moscow: Mir, 1993. — 176 p.)
- Aarts J., Oversteegen L.* The geometry of Julia sets // Trans. Amer. Math. Soc. — 1993. — No. 338. — P. 897–918.
- Baker I. N., Rippon P. J.* Iterating exponential functions with cyclic exponents // Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. — 105 (1989). — No. 2. — P. 357–375.
- Devaney R. L.* e^z - Dynamics and Bifurcation // International Journal of Bifurcation and Chaos, 1. — 1991. — P. 287–308.
- Devaney R. L.* Cantor bouquets, explosions, and knaster continua: dynamics of complex exponentials // Publicacions Matemàntiques. — 1999. — Vol. 43. — P. 27–54.
- Devaney R., Dan A.* A century of complex dynamics // A Century of Advancing Mathematics. — MAA. — 2015. — P. 15–34.
- Garcia-Morales V.* From deterministic cellular automata to coupled map lattices // J. Phys. A: Math. Theor. — 2016. — Vol. 49. — 295101 (17 pp).
- Geluk J. L.* On the domain of attraction of $\exp(-\exp(-x))$ // Statistics and Probability Letters. — 1996. — Vol. 31, No. 2. — P. 91–95(5).
- Ghys É., Goldberg L. R., Sullivan D. P.* On the measurable dynamics of $z \mapsto e^z$ // Ergodic Theory Dynam. Systems. — 1985. — Vol. 5, No. 3. — P. 329–335.
- Goldberg R., Keen L.* A finiteness theorem for a dynamical class of entire functions // Ergodic Theory and Dynamical Systems. — 1986. — Vol. 6. — P. 183–192.
- Kapoor G. P., Prasad M. G. P.* Dynamics of $(e^z - 1)/z$: the Julia set and Bifurcation // Ergodic Theory and Dynamical Systems. — 1998. — No. 18 (6). — P. 1363–1383.
- Kapoor G. P., Prasad M. G. P.* Chaotic burst in the dynamics of a class of noncritically finite entire functions // Int. J. Bifurcation Chaos, 09. — 1999. — P. 1137–1151.
- Kotus J.* Cantor bouquets for non-entire meromorphic functions // Workshop on Cantor bouquets in hedgehogs and transcendental iteration, june 16th–19th 2009, Toulouse, France. [Electronic resource]: http://www.math.univ-toulouse.fr/anr_abc/bouquet/Slides/Janina.pdf
- Mandelbrot B. B.* Fractals: form, chance, and dimension // WH Freeman. — 1977. — 365 p.
- Matyushkin I. V.* On some properties of an $\exp(iz)$ map. // Russian Journal of Nonlinear Dynamics. — 2016. — Vol. 12, No. 1. — P. 3–15.
- Mihaljević-Brandt H.* Topological Dynamics of Transcendental Entire Functions. — PhD dissertation. — Univ. of Liverpool, England, 2009.
- Petek P., Kirchgraber M. U. S.* The Dynamics of $\lambda z + \exp(z)$ // Journal of Mathematical Analysis and Applications. — 1998. — Vol. 222, No. 1. — P. 38–63 (26).
- Prasad M. G. P.* Chaotic burst in the dynamics of $f_\lambda(z) = \lambda(\sinh(z)/z)$ // Regular and Chaotic Dynamics. — 2005. — No. 10 (1). — P. 71–80.
- Rempe-Gillen L., Sixsmith D.* Hyperbolic entire functions and the Eremenko-Lyubich class: Class B or not class B? [Electronic resource]: <http://arxiv.org/pdf/1502.00492v1.pdf> (2016).

- Rocha M. M.* Existence of indecomposable continua for unstable exponentials // *Topology Proceedings*. — 2002a. — Vol. 27, No. 1. — P. 233–244.
- Rocha M. M.* On indecomposable subsets of the Julia set for unstable exponentials. — PhD dissertation. — Boston University, 2002b.
- Romera M., Pastor G., Alvarez G., Montoya F.* Growth in complex exponential dynamics // *Computers and Graphics*. — 2000. — Vol. 24, No. 1. — P. 115–131 (17).
- Schleicher D.* Dynamics of Entire Functions / In Book «Holomorphic Dynamical Systems». — Springer: Lectures given at the C.I.M.E. Summer School held in Cetraro, Italy, July 7–12, 2008.
- Uludag M., Ayral H.* Dynamics of a family of continued fraction maps // *Experimental mathematics*, 2017. [Electronic resource]: <https://doi.org/10.1080/14689367.2017.1390070>
- Urbáński M., Zdunik A.* Real analyticity of Hausdorff dimension of finer Julia sets of exponential family // *Ergodic Theory Dynam. Systems*. — 2004. — Vol. 24, No. 1. — P. 279–315.

Приложение

```

function [tr, fin] = Julia(flag, choice, mu0, Depth, Region, Point)
%%% Построение множеств Жюлиа и Фату.
% Формат вызова [tr, FJ] = Julia(2, 3, 1+2i, [200 400 600], [-5 5;-5 5], [0 0]);
% tr – вектор-орбита точки, координаты x и y которой задаются Point;
% fin – судьбы орбит, в 3-м измерении – 1й слой – код завершения,
% 2й – номер хода, 3й – последнее значение орбиты.
% Код завершения: 0 – уход в бесконечность, 1 – сходимость к равновесию,
% 2 – медленное схождение к равновесию, когда число итераций больше глубины расчета,
% 3 – хаотическая или квазипериодическая орбита.
% flag: если аргумент равен 0, то просчитывается только орбита, рисуется ее график; если равен 1,
% то просчитывается только множество Жюлиа; если равен 2, то выполняются обе операции.
% choice – выбор функции (map) из трех, зависящей от параметра mu0.
% Depth – глубина расчета трехэлементным вектором: 1 – число точек по x, 2 – по y, 3 – максимальная
% длина орбиты (шагов по t).
%%%

%constants
eq=0.576412723031435+1i*0.374699020737117; %eq2 = 0.373217667547526 + 1i*0.580971149430551;
eps1=1e-5; eps2=1e-3; ColorOrbit=[1 0 0; 1 0.5 0; 1 1 0; 0 1 0; 0 0 1; 1 0 1]; orbita=zeros(Depth(3)+1,1);
%functions
func1 = @(z)(1+ mu0*abs(z-eq))*exp(1i*z); func2 = @(z) exp(1i*z); func3 = @(z) mu0*exp(1i*z);
switch(choice)
    case 1
        func=func1;
    case 2
        func=func2;
    case 3
        func=func3;
    otherwise
        func=@(z) z.^2+mu0;
end

switch (flag)
    case 0
        ViewOrbit(); tr=orbita; fin=0;
    case 1
        tr=0; FatouJulia(1);
    case 2
        ViewOrbit(); tr=orbita; FatouJulia(2);
    otherwise
        tr=0; fin=0; error('Первый аргумент: 0-1-2 ?');
end

function [dest,num,last] = Orbit (z0)
    orbita(1)=z0; step = 0;
    while(1)
        step = step + 1; orbita(step+1) = func(orbita(step));
        if (~isfinite(orbita(step+1)))
            dest=0; num=step; last=orbita(step);
            break
        end;
        if (abs(orbita(step+1)-orbita(step))<eps1)
            dest=1; num=step; last=orbita(step);
            break
        end;
    end;
end

```

```

if (step > Depth(3))
    num=step; last=orbita(step);
    if (abs(orbita(step+1)-orbita(step))<eps2)
        dest=2;
    else dest=3;
    end
    break;
end; end; end

function ViewOrbit ()
    [c1,c2,last] = Orbit(Point(1)+1i*Point(2)); N=size(ColorOrbit,1); len=ceil(c2/N); base=1:N;
    base=ones(len,1)*base; radius=round(100./base(1:c2)); color_orbita=ColorOrbit(base(:,:)); figure(1);
    color_orbita = color_orbita(1:c2,:); scatter(real(orbita(1:c2)),imag(orbita(1:c2)), radius(1:c2), color_orbita);
    grid on; title('Orbit of  $z=(0,0)$ ');
end

function FatouJulia(way)
    tic; [X,Y]=meshgrid(linspace(Region(1,1),Region(1,2),Depth(1)+1), linspace(Region(2,1),Region(2,2),...
    Depth(2)+1)); Z=X+i*Y; temp=zeros(size(Z)); fin=cat(3,temp,temp,temp); clear('temp');
    [fin(:,1),fin(:,2),fin(:,3)]=arrayfun(@Orbit,Z); toc; ViewFJ(way);

function ViewFJ(way)
    ncolor=128;
    switch(way)
    case 1
        temp=(fin(:,1)==0); temp1=(1-2*temp).*fin(:,2);
        nc_inf=ceil(ncolor*abs(min(temp1(:)))/max(temp1(:))); figure(2);
        colormap([flipud(gray(nc_inf));flipud(parula(ncolor))]);
        contourf(X,Y,temp1,'LineStyle','none'); grid('on'); colorbar;

    case 2
        info_dest=zeros(5,4); sfin=size(fin); sf=sfin(1)*sfin(2);
        shift_fin=zeros(sfin(1),sfin(2)); temp=ones(1,sf);
        for dest=0:3
            temp=find((fin(1:sf)==dest));
            if (~isempty(temp))
                info_dest(1,dest+1)=max(fin(sf+temp))+1; info_dest(2,dest+1)=min(fin(sf+temp));
            else
                info_dest(1,dest+1)=1;info_dest(2,dest+1)=0;
            end
            info_dest(5,dest+1)=nnz(temp); shift_fin(temp)=dest;
        end
        info_dest(3,:)=cumsum(info_dest(1:3)); info_dest(4,:)=info_dest(1,:)-info_dest(2,:);
        temp=sum(info_dest(4,:)); info_dest(4,:)=ceil(ncolor/temp*info_dest(4,:));
        Cnames={'gray','winter','hot','autumn'}; Cmap=[];
        for dest=(0:3)+1
            eval(strcat('temp=',Cnames{dest},('num2str(info_dest(4,dest)),');)); Cmap=[Cmap;temp];
        end
        % Суммарно по полю: по столбцам - коды, по строкам
        % max, min элементы, сдвиг элемента, число цветов, общее число элементов такого рода.
        info_dest, figure(3); colormap(jet(4)); title(gca,'faceted'); shading flat; pha=pcolor(X,Y,shift_fin);
        set(pha,'EdgeColor','none'); grid on; colorbar; ffin=@(a) info_dest(3,a+1);
        shift_fin=fin(:,2)+arrayfun(ffin,shift_fin); figure(4); title(gca,'FatouJuliaSets'); colormap(Cmap);
        ph=pcolor(X,Y,shift_fin); set(ph,'EdgeColor','none'); shading flat; colorbar; grid on;
    end; end; end; end

```